Лицензия: ЛО-78-01-007414 от 12.12.2016 г.
ISO 9001:2008 (SGS); ISO 15189:2012 (Bureau Veritas)
Код в реестре внешнего контроля качества EQAS 8659
Код в реестре внешнего контроля качества ФСВОК 5871

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

Договор:

ПАЦИЕНТ:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:

Регистрация:

Вид материала: Мазок смешанный из цервикального канала и поверхности шейки матки

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *

Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN)

Метод и оборудование: Иммуноцитохимический.

Качество препарата	адекватный
Стандартное цитологическое исследование	Материал представлен железистыми клетками в однослойных пластах, полосках, трубочках. Почти все трубчатые структуры открыты с обоих концов (открытый тип), немногие на одном крае имеют форму сферы (закрытый тип). Полярность расположения клеток сохранена. Границы клеток нечеткие. Цитоплазма скудная, гомогенная или нежно вакуолизированная. Ядра одинакового размера и формы (округлые или овальные) с зернистым хроматином и четко различимыми мелкими ядрышками. Обнаруживаются группы стромальных клеток, которые имеют овальные ядра и плохо различимую цитоплазму. Выраженный воспалительный компонент, представленный нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами и единичными плазматическими клетками в строме.
Иммуноцитохимическое исследование	Прогестероны (Progesterone Receptor Clone PgR 636) - до 40% - 2 балла.
Заключение	По совокупности данных цитологического и иммунноцитохимического исследований эндометрий соответствует ранней пролиферативной фазе менструального цикла с нарушением нормального рецепторного статуса в сторону увеличения рецепторного прогестерона (Прогестероны (Progesterone Receptor Clone PgR 636) - до 40% - 2 балла.).
Врач	ФИО

Комментарий: Иммуноцитохимическое исследование проведено на клетках эндометрия с использованием моноклональных антител DAKO (Дания) Ki-67 Clone MIB-1, Progesterone Receptor Clone PgR 636. Система детекции EnVision, на аппарате DAKO Autostainer Linl 48. Использованы следующие количественные критерии (степень): отсутствие позитивно меченых клеток - 0, до 20% - 1, до 40% - 2, до 60% - 3, до 80% - 4, до 100% - 5. Дополнительно по степени интенсивности окрашивания: слабая, умеренная, высокая интенсивность. Оценено по методу Allred Score = PS + IS (range 0-8) HISTO SKOR.

Отчет создан:

Заведующая лабораторией: _____ /И.И. Скибо/