



Лабораторная служба Хеликс
 Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
 Информация в интернете: www.helix.ru
 Лицензия: ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.
 Код в реестре внешнего контроля качества:
 EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

ПАЦИЕНТ:

Договор:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Видматериала: Венозная кровь

Регистрация:

Валидация (врач):

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени, IgG

Метод и оборудование: Иммуноблоттинг

Антитела к Sp-100	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к SLA/LP	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к PML	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к M2-3E	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1)	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к LC-1	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к gp210	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к митохондриям (AMA-M2)	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к SS-A (52 кДа)	не обнаружены	не обнаружены

Комментарий: (+/-) - пограничный результат, 1+ - низкое содержание аутоантител к специфическому антигену, 2+ - среднее содержание аутоантител к специфическому антигену, 3+ - высокое содержание аутоантител к специфическому антигену

Антиядерный фактор на HEp-2-клетках, IgG

Метод и оборудование: Непрямая реакция иммунофлюоресценции

Титр	2560	<160
Тип свечения	Гомогенный тип свечения (AC-1)	
Результат	положительный	отрицательный

Антитела к гладким мышцам

Метод и оборудование: Непрямая реакция иммунофлюоресценции

Титр	<40	<40
------	-----	-----

Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM)

Метод и оборудование: Непрямая реакция иммунофлюоресценции

Титр	<40	<40
------	-----	-----

Антитела к митохондриям (AMA)

Метод и оборудование: Непрямая реакция иммунофлюоресценции

Титр	<40	<40
Результат	отрицательный	отрицательный

Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка

Метод и оборудование: Непрямая реакция иммунофлюоресценции

Титр	<40	<40
------	-----	-----

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Заведующая лабораторией:  И.И. Скибо